ΑΑ-064

Κλινικά χαρακτηριστικά, αντιμετώπιση και πρόγνωση των ασθενών με πρωτοπαθές κακόηθες μελάνωμα κόλπου

Χ. Βίτσας, Γ. Ανδρουτσόπουλος, Α. Γεωργαντής, Γ. Μιχαήλ, Γ. Αντωνάκης, Γ. Δεκαβάλας
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο

Σκοπός: Η ανασκόπηση των κλινικών χαρακτηριστικών, της αντιμετώπισης και της πρόγνωσης των ασθενών με πρωτοπαθές κακόηθες μελάνωμα κόλπου.

Ανασκόπηση: Η αιτιολογία και η παθογένεση του πρωτοπαθούς κακοήθους μελανώματος του κόλπου, παραμένει αδιευκρίνιστη και έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες. Οι ασθενείς συνήθως είναι μετεμμηνοπαυσιακές. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι: κολπική αιμορραγία, κολπική υπερέκκριση, ψηλαφητή μάζα στον κόλπο και άλγος.

Η χειρουργική επέμβαση έχει πρωταρχικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ασθενών. Ποικίλει από συντηρητικό χειρουργείο (ευρεία τοπική εκτομή), έως ριζική χειρουργική επέμβαση (κολπεκτομή, πυελική εξεντέρωση).

Στις ασθενείς με προχωρημένο στάδιο νόσου, γίνεται πιο επιθετική αντιμετώπιση με συμπληρωματική ακτινοθεραπεία και/ή ανοσοθεραπεία.

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο θεραπείας, η 5-ετής επιβίωση των ασθενών είναι 8,4-17,5%. Ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας είναι το μέγεθος του όγκου (<3 cm).

Συμπέρασμα: Η πρόγνωση του πρωτοπαθούς κακοήθους μελανώματος του κόλπου είναι πολύ πτωχή ανεξάρτητα από την εφαρμοζόμενη θεραπεία, επειδή οι περισσότερες περιπτώσεις διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο.